

NOSCAPINE HCL 1=1 PCH  
stroop

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.3 : Bijsluiter

Datum : 29 januari 2008

Bladzijde : 1

**BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER**

**NOSCAPINE HCL, stroop 1 mg/ml**

Noscapine

**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Noscapine HCl 1=1 PCH zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

**In deze bijsluiter:**

1. Wat is Noscapine HCl 1=1 PCH en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Noscapine HCl 1=1 PCH inneemt
3. Hoe wordt Noscapine HCl 1=1 PCH ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Noscapine HCl 1=1 PCH
6. Aanvullende informatie

**1. WAT IS NOSCAPINE HCL 1=1 PCH EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT**

**Geneesmiddelengroep**

Noscapine onderdrukt de hoestprikkel. Noscapine is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest.

**Gebruiken**

- bij prikkelhoest.

**2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NOSCAPINE HCL 1=1 PCH INNEEMT**

**Gebruik Noscapine HCl 1=1 PCH niet**

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor noscapine of voor één van de andere bestanddelen van Noscapine HCl 1=1 PCH.

*Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.*

NOSCAPINE HCL 1=1 PCH  
stroop

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.3 : Bijsluiter

Datum : 29 januari 2008

Bladzijde : 2

**Wees extra voorzichtig met Noscapine HCl 1=1 PCH**

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar gebruikt worden door bij kinderen/ouderen en speciale patiëntengroepen. De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

**Gebruik van Noscapine HCl 1=1 PCH met andere geneesmiddelen**

Voor zover bekend bestaat er geen wisselwerking tussen het gebruik van Noscapine HCl 1=1 PCH en andere (genees)middelen.

*Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.*

**Zwangerschap en borstvoeding**

***Zwangerschap***

Over het gebruik van noscapine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend.

Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

*Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.*

**Borstvoeding**

Noscapine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.

*Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.*

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Noscapine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.

NOSCAPINE HCL 1=1 PCH  
stroop

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.3 : Bijsluiter

Datum : 29 januari 2008

Bladzijde : 3

**Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Noscapine HCl 1=1 PCH**

Eén ml stroop bevat 0,745 g saccharose. Bij gebruik van de maximaal aanbevolen dosering (=30 ml) levert elke dosis 22,35 g saccharose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Verder kan saccharose maagdarmlicheten en diarree veroorzaken.

Dit product bevat methylparahydroxybenzoaat, dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderlijke gevallen bronchospasme.

**3. HOE WORDT NOSCAPINE HCL 1=1 PCH INGENOMEN**

Volg bij het gebruik van Noscapine HCl 1=1 PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

***Volwassenen***

15-30 ml 3 tot 4 maal per dag (=24 uur).

***Kinderen van 6-12 jaar***

15 ml 2 tot 4 maal per dag.

***Kinderen van 3-6 jaar***

7,5 ml 2 tot 4 maal per dag.

*Als u merkt dat Noscapine HCl 1=1 PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.*

Wijze van gebruik

De dosering dient u af te meten met de meegeleverde maatbeker. De aangegeven dosering niet overschrijden.

*U mag de stroop niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.*

**Wat u moet doen wanneer u meer van Noscapine HCl 1=1 PCH heeft ingenomen dan u zou mogen**

Wanneer u teveel van Noscapine HCl 1=1 PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

**Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Noscapine HCl 1=1 PCH in te nemen**

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Noscapine HCl 1=1 PCH om zo de vergeten dosis in te halen.

NOSCAPINE HCL 1=1 PCH  
stroop

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.3 : Bijsluiter

Datum : 29 januari 2008

Bladzijde : 4

#### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Noscapine HCL 1=1 PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

##### *Afweersysteem*

Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog of neusslijmvlies.

##### *Zenuwstelsel*

Sufheid, duizeligheid.

##### *Maag- en darmstelsel*

Misselijkheid.

*Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.*

#### 5. HOE BEWAART U NOSCAPINE HCL 1=1 PCH?

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

*Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.*

Gebruik Noscapine HCL 1 = 1 PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "niet te gebruiken na" of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

#### 6. AANVULLENDE INFORMATIE

##### **Wat bevat Noscapine HCL 1=1 PCH**

- Het werkzame bestanddeel is  
noscapinehydrochloride, 1 mg per ml stroop.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn  
citroenzuur(E330), methylparahydroxybenzoaat(E218), saccharoïdenatrium, saccharose, frambozenessence, gezuiverd water.

##### **Hoe ziet Noscapine HCL 1=1 PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking**

Flacon à 150 en 300 ml stroop.

NOSCAPINE HCL 1=1 PCH  
stroop

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS  
1.3.3 : Bijsluiter

Datum : 29 januari 2008  
Bladzijde : 5

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**  
Pharmachemie B.V.  
Swensweg 5  
Postbus 552  
2003 RN Haarlem

**In het register ingeschreven onder**  
RVG 16680, stroop 1 mg/ml.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2008

0108.10v.JB