

Bij koorts en pijn

# Antigrippine®



Tabletten met paracetamol, coffeïne en vitamine C

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening, waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Antigrippine zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.
- Als de doordrukstrip beschadigd of open is, dit geneesmiddel niet gebruiken. Neem in dit geval contact op met GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, zie verder voor adresgegevens.

*Inhoud van deze bijsluiter:*

1. Wat is Antigrippine en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Antigrippine inneemt.
3. Hoe wordt Antigrippine ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Antigrippine?

**Antigrippine tabletten met paracetamol, coffeïne en vitamine C, tabletten**

- De werkzame bestanddelen zijn paracetamol, coffeïne (watervrij) en vitamine C. Eén tablet bevat 250 mg paracetamol, 25 mg coffeïne en 25 mg vitamine C.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn cellulose (E 460), croscarmellose (E 468), natriumsaccharine (E 954), magnesiumstearaat (E 470B), ethylcellulose (E 462) en povidon (E 1201).

**Registratiehouder:**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV  
Postbus 2871, 3500 GW Utrecht  
Tel: 030 - 693 8760

Antigrippine is in het register ingeschreven onder RVG 06288.

## 1. WAT IS ANTIGRIPPINE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

- Antigrippine is een geneesmiddel in de vorm van een tablet.
- Antigrippine bevat paracetamol, coffeïne en vitamine C. Paracetamol heeft een pijnstillende en koortsverlagende werking. Coffeïne kan het effect van paracetamol versterken. Vitamine C kan indirect het weerstandsvermogen van het lichaam verhogen.
- Antigrippine is verpakt in een doordrukstrip. Een doordrukstrip bevat 10 tabletten. In een doosje zitten 2 doordrukstrips van 10 tabletten.
- Antigrippine behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben.
- Antigrippine tabletten worden gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid, spierpijn, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, menstruatiepijn, koorts en pijn na vaccinatie.

## 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ANTIGRIPPINE INNEEMT.

**Gebruik Antigrippine niet...**

- Wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van Antigrippine.

**Wees extra voorzichtig met Antigrippine**

- Wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft.
- Bij chronische alcoholisme dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (= 8 tabletten Antigrippine).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

**Gebruik van Antigrippine in combinatie met voedsel en drank**

Geen bijzonderheden

**Zwangerschap**

Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Overmatig gebruik van coffeïne bevattende producten dient te worden vermeden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

**Borstvoeding**

Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Antigrippine tabletten hebben, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

**Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Antigrippine**

- Antigrippine tabletten bevatten 25 mg coffeïne per tablet. Gelijktijdig gebruik van grote hoeveelheden coffeïnebevattende dranken (koffie, thee en cola) kan duizeligheid, nervositeit en slapeloosheid veroorzaken.

**Gebruik van Antigrippine in combinatie met andere geneesmiddelen**

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. De werkzame stoffen in Antigrippine zijn paracetamol, coffeïne en vitamine C.



Tabletten met paracetamol, coffeïne en vitamine C

- Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramfenicol (= antibioticum) verlengen.
- Bij gelijktijdig, langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine (= anti AIDS geneesmiddel) komt een bepaalde bloedafwijking vaker voor.
- Bij gebruik van barbituraten (= bepaalde slaapmiddelen en bepaalde middelen tegen epilepsie) kan een eventuele overdosering met paracetamol ernstige gevolgen hebben. Dit is ook het geval bij chronische alcoholisme.

### 3. HOE WORDT ANTIGRIPPINE INGENOMEN?

#### Volwassenen:

2-4 tabletten per keer. Maximaal 12 tabletten per etmaal.

#### Kinderen:

1 - 4 jaar (10-17 kg):	½ tablet per keer,	4-6 maal per dag.
4 - 6 jaar (17-22 kg):	1 tablet per keer,	3-4 maal per dag.
6 - 9 jaar (22-30 kg):	1 tablet per keer,	4-6 maal per dag.
9 - 12 jaar (30-40 kg):	1 ½ tablet per keer,	4-6 maal per dag.
12-15 jaar (40-55 kg):	2 tabletten per keer,	4-6 maal per dag.

Wijze van innemen: laat de tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen vallen, goed omroeren en opdrinken. De tablet mag echter ook in zijn geheel doorgeslikt worden.

- Het minste aantal toedieningen per dag is bestemd voor de jongste kinderen in een bepaalde groep.
- Tussen twee innamen moet minstens 4 uur liggen.
- Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende geneesmiddelen.
- De aangegeven dosering niet overschrijden.
- Wanneer de symptomen van pijn en/of koorts weer opkomen, kan toediening herhaald worden.
- Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.
- Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden of regelmatig terugkeren, dient u uw arts te raadplegen.
- Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening langer dan 2 dagen ontraden.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u merkt dat Antigrippine tabletten te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

#### Wat u moet doen wanneer u te veel van Antigrippine heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Antigrippine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij innamen van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in één maal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

#### Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Antigrippine in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis Antigrippine om zo de vergeten dosis in te halen. Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema.

#### Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Antigrippine tabletten wordt gestopt

Het gebruik van Antigrippine tabletten kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.

### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Antigrippine bijwerkingen veroorzaken. Van Antigrippine tabletten zijn de volgende bijwerkingen beschreven:

- In de aanbevolen dosering treden weinig bijwerkingen op. Verschijnselen van overgevoeligheid voor paracetamol, zoals huiduitslag, gebulten en koorts, kunnen optreden. Bij het stoppen met het gebruik verdwijnen deze verschijnselen weer.
- In zeldzame gevallen kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:
  - na langdurig gebruik kan een zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotseling hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) voorkomen.
  - bloeduitstortingen als gevolg van een tekort aan bloedplaatjes (thrombocytopenische purpura) en bloedarmoede als gevolg van een te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie) kunnen optreden.
- Na zeer langdurig gebruik van hoge doses is een enkele maal een ontsteking van de nieren, die gepaard gaat met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), waargenomen.
- Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol (= 12-16 tabletten) per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram (=24 tabletten) ineens is leverbeschadiging mogelijk.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

### 5. HOE BEWAART U ANTIGRIPPINE?

- Antigrippine buiten bereik en zicht van kinderen houden.
- Niet bewaren boven 25°C. In de originele verpakking bewaren.

**Uiterste gebruiksdatum:** Gebruik Antigrippine niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in 07/2007